

CLENPIQ® PREP Instructions

DO NOT Follow instructions on the box*

**Clenpiq prescription has been sent to your pharmacy electronically.
Please pick up within 1 week.**

What you need to pick up/purchase:

- Pick up your prescription from your pharmacy
- Simethicone 180mg Soft Gel Tablets (ex: Gas-X, Phazyme, Mylicon). *This is purchased over the counter at any pharmacy.*

DAY BEFORE PROCEDURE:

Follow a clear liquid diet **all day**. **DO NOT** have any alcohol, dairy products, solids and nothing with red or purple dyes. It is very important to drink plenty of clear liquids throughout the entire day.

Clear Liquid Suggestions:

- Popsicles (not red or purple)
- Clear broth or bouillon
- Black coffee and/or tea (no cream, milk or non-dairy creamer)
- Clear Juice with no pulp (apple, white grape, and lemonade) Do not have Orange Juice
- JELL-O (lemon, lime, or orange flavor)
- Gatorade and/or Powerade (clear, green or yellow)
- Soda (Sprite, Ginger Ale, 7-Up or Cola)

- 1. At 4:00pm** - Take 2 Simethicone 180mg Soft-gel Tablets .
 - a.** Drink 1 entire bottle of Clenpiq Prep Solution from the bottle. Over the next couple hours follow it with at least 40 ounces of clear liquids of your choice.
 - b.** Continue clear liquids for the remainder of the evening. Since it is less in prep solution, you want to increase clear liquids to assure you have a clear prep.

DAY OF PROCEDURE

- 1. Continue Clear Liquid Diet**
- 2. 6 hours prior to arrival**, take 2 Simethicone 180mg Soft-gel Tablets and then drink the second bottle of Clenpiq Prep Solution .
- 3.** Follow with at least 40 ounces of clear liquids of your choice within an hour and continue clear liquids up to 4 hours prior to your procedure.

DO NOT have anything by mouth 4 hours prior to your arrival*

Instrucciones de preparación de CLENPIQ®

NO siga las instrucciones de la caja

La receta de Clenpiq ha sido enviada a su farmacia.
electrónicamente. Recójalo dentro de 1 semana.

Qué necesitas recoger/comprar:

- Recoja su receta en su farmacia
- Tabletas de gel blando de simeticona de 180 mg (por ejemplo, Gas-X, Phazyme, Mylicon). *Este se compra sin receta en cualquier farmacia.*
- Líquidos claros

DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Siga una dieta de líquidos claros durante todo el día anterior al procedimiento. no consuma alcohol, productos lácteos, sólidos y nada con colorantes rojos o morados. Es muy importante beber muchos líquidos claros durante todo el día.

Sugerencias de líquidos claros:

- Paletas heladas (no rojas ni moradas)
- Caldo claro o consomé
- Café negro y/o té (sin nata, leche ni cremas vegetales)
- Jugo claro sin pulpa (manzana, uva blanca y limonada)
no consuma jugo de naranja
- JELL-O (sabor limón, lima o naranja)
- Gatorade y/o Powerade (transparente, verde o amarillo)
- Refresco (Sprite, Ginger Ale, 7-Up o Cola)

- 1) A las 4:00 pm** - tome 2 tabletas de gel blando de simeticona de 180 mg y luego comience su preparación.
- 2)** Beba 1 botella entera de solución de preparación Clenpiq directamente de la botella. Continúe con al menos 40 onzas de líquidos claros de su elección durante las próximas horas.
- 3)** Continúe con líquidos claros durante el resto de la noche. Ya que es menos preparación. solución que otras, desea aumentar los líquidos claros para asegurarse de tener una preparación clara

EL DÍA DE SU PROCEDIMIENTO:

- 1) 6 horas antes de la llegada** - Tome 2 comprimidos de gel blando de simeticona de 180 mg y luego bebe la segunda botella de preparación Clenpiq.
- 2)** Continúe con al menos 40 onzas de líquidos claros de su elección dentro de una hora. y continúe con líquidos claros hasta 4 horas antes de su procedimiento.
- 3)** 4 horas antes de su hora de llegada, no podrá tomar nada por vía oral.