

GoLYTELY®/TriLYTE® PREP Instructions

Generic Prep (GaviLyte-G (PEG-3350))

FOLLOW THE PREP INSTRUCTIONS BELOW AND NOT THE ONES ON THE BOX.

What to you to complete your prep:

- Pick up your prescription at your pharmacy within 5 days. If it is longer than 5 days, they will place back on the shelf.
- Simethicone Soft-gel Tablets 180mg (ex: Gas-X, Phazyme, Mylicon)

DAY BEFORE YOUR PROCEDURE:

- **Clear liquid diet all day. Do not** have any alcohol, dairy products, solids and nothing with purple or red dyes. It is very important to drink plenty of clear liquids throughout the entire day.

➤ Clear Liquid Suggestions:

- Popsicles (not red or purple)
- Clear broth or bouillon
- Black coffee and/or tea (no cream, milk, or non-dairy creamer)
- Clear juice with no pulp (apple, white grape, and lemonade) **Do not have Orange Juice**
- JELL-O (lemon, lime, or orange flavor)
- Gatorade and/or Powerade (Clear, green or yellow)
- Soda (Sprite, ginger ale, 7-Up, cola)

1. **4:00pm** take 2 Simethicone Soft-Gel Tablets and then begin
2. Drink GoLYTELY®/TriLYTE®, 1-2 glasses every 10-20 minutes until half of the prep is gone.
3. Continue clear liquid diet the remainder of the day/night.

DAY OF YOUR PROCEDURE:

1. **6 hours** prior to your arrival time, take 2 Simethicone Soft-Gel tablets and begin the second portion of your prep.
2. Drink 1-2 glasses every 10-20 minutes until the prep is completed.
3. Continue Clear Liquids until 4 hours prior to your arrival time.

DO NOT have anything by mouth 4 hours prior to your arrival time

Instrucciones de preparación de GoLYTELY®/TriLYTE® Preparación genérica (GaviLyte-G (PEG-3350))

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN A CONTINUACIÓN Y NO LAS DE LA CAJA:

Qué debes completar tu preparación:

- Recoja su receta en su farmacia dentro de los 5 días. si es mas largo de 5 días, se volverán a colocar en el estante.
- Tabletas de gel blando de simeticona de 180 mg (por ejemplo, Gas-X, Phazyme, Mylicon)
- Líquidos claros

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

- Dieta de líquidos claros todo el día. No consuma alcohol, productos lácteos, sólidos y nada con tintes morados o rojos. Es muy importante beber muchos líquidos claros durante todo el día.

➤ Sugerencias de líquidos claros:

- Paletas heladas (no rojas ni moradas)
- Caldo claro o consomé
- Café negro y/o té (sin crema, leche ni cremas vegetales)
- Jugo claro sin pulpa (manzana, uva blanca y limonada)

No tener jugo de naranja

- JELL-O (sabor a limón, lima o naranja)
- Gatorade y/o Powerade (transparente, verde o amarillo)
- Soda (Sprite, ginger ale, 7-Up, cola)

- 1) A las 4:00 p. m., tome 2 tabletas de gel blando de simeticona y luego comience tu preparación.
- 2) Beba GoLYTELY®/TriLYTE®, 1-2 vasos cada 10-20 minutos hasta! La mitad de la preparación se ha ido.
- 3) Continúe con la dieta de líquidos claros el resto del día/noche.

DÍA DE SU PROCEDIMIENTO:

- 1) 6 horas antes de la hora de llegada, tome 2 Simeticone Soft-Gel tabletas y comience la segunda parte de su preparación.
- 2) Beba 1-2 vasos cada 10-20 minutos hasta que la preparación esté terminado.
- 3) Continuar con líquidos claros

NO tome nada por vía oral 4 horas antes de su hora de llegada