

MoviPrep® Instructions

(Generic Brand: Peg-3350/Polyethylene Glycol
33500)

DO NOT Follow Instructions on the box

**MoviPrep prescription has been sent to your pharmacy electronically.
Please pick up within 1 week.**

What you need to pick up/purchase:

- Pick up prescription from your pharmacy
- Simethicone Soft-gel Tablets 180mg (ex: Gas-X, Phazyme, Mylicon)
These are available for purchase over the counter at any pharmacy.

Day Before Procedure:

1. Clear liquid diet all day. **DO NOT** have any alcohol, dairy products, solids and nothing with red or purple dyes. It is very important to drink plenty of clear liquids throughout the entire day.
 - Clear Liquid Suggestions:
 - Popsicles (not red or purple)
 - Clear broth or bouillon
 - Black coffee and/or tea (no cream, milk, or non-dairy creamer)
 - Clear juice with no pulp (apple, white grape, and lemonade). Do not have Orange Juice
 - JELL-O (lemon, lime, or orange flavor)
 - Gatorade and/or Powerade (clear, green or yellow)
 - Soda (Sprite, Ginger Ale, 7-Up, cola)
2. At 4:00pm:
 - Take 2 Simethicone Soft-Gel Tablets
 - Empty 1 Pouch A & 1 Pouch B into disposable container
 - Add lukewarm water to the top of line in container. Mix to dissolve. (*You can mix the solution the morning of and place in the fridge if you prefer*)
 - The container has 4 marks. Drink down to each line every 15 minutes until complete.
 - Continue to drink clear liquids for the remainder of the evening.

Day of Procedure:

1. Continue clear liquid diet.
2. **6 hours** prior to your arrival time, take 2 Simethicone soft-gel tablets and mix the last pouches A & B into container with lukewarm water up to the top line in the container. (*you can do this before you go to bed the night before the procedure*).
3. Drink down to each line every 15 minutes until complete

****DO NOT have anything by mouth 4 hours prior to your arrival****

Instrucciones de MoviPrep® (Marca genérica: Peg-3350/ Polietilenglicol 33500)

**La receta de MoviPrep ha sido enviada a su farmacia.
electrónicamente. Recójalo dentro de 1 semana.**

Qué necesitas recoger/comprar:

- Recoja su receta en su farmacia
- Simethicone en tabletas de gel blando de 180 mg (por ejemplo, Gas-X, Phazyme, Mylicon, se pueden comprar sin receta en cualquier farmacia.)

el Día Antes del Procedimiento:

1. Siga un dieta de líquidos claros todo el día antes del procedimiento. No consumas alcohol, productos lácteos, sólidos y nada con colorantes rojos o morados. Es muy importante beber mucho de líquidos claros durante todo el día.
 - Sugerencias de líquidos claros:
 - Paletas heladas (no rojas ni moradas)
 - Caldo claro o consomé
 - Café negro y/o té (sin crema, leche ni cremas vegetales)
 - Jugo claro sin pulpa (manzana, uva blanca y limonada).
No consumir jugo de naranja
 - JELL-O (sabor a limón, lima o naranja)
 - Gatorade y/o Powerade (transparente, verde o amarillo)
 - Refrescos (Sprite, Ginger Ale, 7-Up, cola)
2. A las 16:00 horas:
 - Tome 2 tabletas de Simeticona
 - Vacíe 1 bolsa A y 1 bolsa B en un recipiente desechable.
 - Agregue agua tibia hasta la parte superior de la línea del recipiente. Mezclar para disolver.
(tú Puede mezclar la solución por la mañana y colocarla en el refrigerador si lo prefiere)
 - El contenedor tiene 4 marcas. Beba hasta cada línea cada 15 minutos hasta completo.
 - Continúe con líquidos claros el resto de la noche.
 - Refresco (Sprite, Ginger Ale, 7-Up o Cola)

Día del Procedimiento:

1. Continúe con líquidos claros.
2. 6 horas antes de la hora de llegada, tome 2 tabletas de Simethicone y mezcle el último bolsas A y B en un recipiente con agua tibia hasta la línea superior en contenedor (puede hacer esto antes de acostarse la noche anterior al procedimiento).
3. Beba hasta cada línea cada 15 minutos hasta completar

****NO bebas nada 4 horas antes de su llegada****